

"LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANINO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide; Piretroide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial, si fuera necesario.

#### TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0800-13040, 328-7700  
CISPROQUIM 080-050-847  
ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)  
INFOSALUD 0800-10-828  
ARYSTALIFESCENCE PERU SAC 01-719-4899

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de a menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# KARIBU®

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

#### Composición:

Acetamiprid..... 100 g/L  
Cypermethrin..... 50 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. PQUA No. 2175 -SENASA

Titular del Registro:

**ARYSTA LIFESCENCE PERU SAC**

Jr. Caracas 226, Urb. Oyague

Jesús María - Lima - Perú



#### Formulador:

**ARYSTA LIFESCENCE OUGRÉE PRODUCTION SPRL**

Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougrée

Belgica

Importado y distribuido por:

**AGRITOP S.A.C.**

Av. Los Gorriones 130

Urb. La Campiña, Chorrillos Lima-Perú

Telf. 7191717 / 7191718



No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 4 L**

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

® = Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KARIBU® es un insecticida sistémico y traslaminar, actúa por contacto e ingestión, afecta al sistema nervioso causando parálisis y muerte del insecto; formulado a base de Acetamiprid y Cypermethrin, que le confiere una alta eficacia en el control de insectos defoliadores, minadores, áfidos y thrips en una amplia gama de cultivos de importancia económica.

KARIBU®, la aplicación de los tratamientos se realizará vía terrestre de forma dirigida al follaje, realizando una distribución uniforme del pulverizado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

| CULTIVO   | PLAGA                                 |                                          | DOSIS   |             | PC<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                       |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------------------------|
|           | Nombre común                          | Nombre científico                        | L/Ha    | L/200L      |              |                                       |
| Espárrago | Trips                                 | <i>Thrips tabaci</i>                     | 0.6-0.7 | 0.192-0.224 | 3            | 0.01 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup> |
| Vid       |                                       |                                          | 0.5-0.6 | 0.125-0.15  | 28           | 0.9 <sup>1</sup><br>2.0 <sup>2</sup>  |
| Arroz     | Mosca minadora del arroz              | <i>Hydrellia wirthi</i>                  | 0.225   | 0.15        | 14           | 0.01 <sup>1</sup><br>2.0 <sup>2</sup> |
|           | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i> | 0.3     | 0.2         |              |                                       |
| Pimiento  | Caracha                               | <i>Prodidoplosis longifolia</i>          | 0.6     | 0.3         | 7            | 2.0 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup>  |

\* Gasto de agua: Espárrago: 625 L/Ha  
Vid: 800 L/Ha  
Arroz: 300 L/Ha  
Pimiento: 400 L/Ha

<sup>1</sup> Acetamiprid

<sup>2</sup> Cypermethrin

**PC:** Periodo de carencia

**LMR:** Límite máximo de residuos.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se realizará una única aplicación por campaña/ año, para espárrago, vid, arroz y pimiento, cuando la plaga se encuentre en grado 1 de infestación.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas, en caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** En general el producto es compatible con la mayoría de agroquímicos utilizados en dichos cultivos. En el caso de mezcla con otros productos, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa a la mezcla final de los productos, con el fin de determinar la compatibilidad física y fito-compatibilidad de la mezcla a usar

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

