



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA (WG)

COMPOSICIÓN:

THIAMETHOXAM.....250 g/kg

Aditivos.....c.s.p. 1 kg

PQUA N° 274 - SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación


**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena Del Mar
Lima - Perú
Telf.: (51 1) 614-5100

Tagros

**Formulador:
TAGROS CHEMICALS
INDIA LIMITED**

Javer Centre, Rajah building
IV floor,
Chennai, India



**Contenido Neto: 1 kg
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de Vencimiento:**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado en las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoides.

En caso de inhalación, remover al individuo para que respire aire fresco.

En caso de ingestión, no induzca al vómito.

En caso de contacto con la piel o ropa, lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla. Si ha entrado en contacto con los ojos, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. En todos los casos consulte a un médico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)

ESSALUD: 0801-1-10200 (Línea gratuita)

CETOX: (511) 273-2318 – Cel.: 999 072 933,

INTEROC S.A. (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilcelo, triturándolo, perforándolo y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

No emplear el envase para ningún otro fin. Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales para ello; no botar en cualquier sitio, mucho menos en ríos o fuentes de agua.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ACTUP® es un insecticida del grupo químico NEONICOTINOIDE de acción sistémica y actúa por contacto e ingestión.

Aplicar el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual.

Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione **ACTUP®** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en la fase de crecimiento vegetativo y/o fructificación. Realizar una sola aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conoce incompatibilidad alguna, se recomienda hacer pruebas en campo para nuevas mezclas.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis aquí recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	g/cil 200L	kg/ha		
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70 - 100	-	3	0.2
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	70 - 100	-	3	0.3
Palto	Queresa diaspina	<i>Fiorinia florinae</i>	70 - 80	-	3	0.05
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	70 - 100	-	21	0.05
Granado	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	70 - 80	-	16	0.05
Pallar	Cigarrita verde	<i>Empoasca kraemeri</i>	70 -100	-	14	0.5
Espárrago	Caracha (mosquilla de los brotes)	<i>Prodiplotis longifila</i>	75	0.250	7	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	-	0.75 - 1.00	21	0.9

PC: Periodo de Carencia

En cultivos de exportación, considerar las exigencias del país destino.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PEACTUP-W01-19



PANTONES

Orla



pantone
361 c



pantone
157-8 C

Franja toxicológica



pantone
293 - C

Logotipo Actup



pantone
P 48 - 8 C



pantone
P 101 - 8 C

Logotipo Interoc



pantone
446 C



pantone
185 C