

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- DAÑINO. No ingerir y evitar la respiración (aspiración).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado, cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroides.
- En caso de intoxicación o ingestión, conseguir asistencia médica y presentar etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, **NO INDUCIR AL VÓMITO**. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general poner al afectado de costado. conseguir asistencia médica.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
UPL PERÚ S.A.C.: (01) 611-0831
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Encaso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TRINICA

250 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

Composición:

Lambda-cyhalothrin 250 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2180 - SENASA

Títular de Registro:

UPL PERU S.A.C.
Jr. Caracas Nro. 2226 Urb. Oyague
Jesús María - Lima. Teléfono: (01) 611-0831

Formulador:

UPL LIMITED
Uniphos House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (West), Mumbai (Bombay) 400 052, India.
Tel. 91-22-2646 8000. Fax 91-22-2604 100
www.uplonline.com

Importador y Distribuidor:

SILVESTRE INTERNATIONAL COMPANY SAC
RUC: 20603903359
Av. Nicolás de Ayllón N° 2941 dpto. 7A Z.I.
El Agustino, Lima - Perú. Telf.: (01) 644-9297
www.silvestreshanghai.com

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

CONTENIDO NETO: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRINICA 250 CS es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión, a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobre-excitación nerviosa y luego la muerte.

TRINICA 250 CS, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Mantener el caldo en constante agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	ml/200L		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.025	25	14	0.1
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	-	50	3	0.01

P.C. Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar previa evaluación de la plaga.
- Para el cultivo de cebolla se recomienda aplicar como máximo 2 veces por campaña, es decir **como máximo aplicar 0.05 L/200L** y siempre previa evaluación.
- Para el cultivo de papa realizar una aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

