

2.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de manipulación y aplicación.
 - Utilizar ropa adecuada durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada, esperar las primeras 24 horas.
 - No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
 - No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
 - Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
 - Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenil pirazoles**
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
 - En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
 - En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
 - En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente o lleve al paciente al médico y retire la ropa de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
 - No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Tel: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
FITOCORP S.A.C: 016522183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y arácnidos beneficios. No aplicar en época de floración.
- No aplicar en aguas superficiales.
- No arrojar los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe limpiar las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades.



30.0 cm

RAYFUR 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil200 g/ L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Pionceras N° 147 Dpto. ZB. Urb. La Molina Vieja. La Molina - Lima
Teléfono: 016522183

Formulado por:

BETA CHEMICALS LTD.
Rm. 707, Bld. A, Kingsound Center, N° 116 Zebuyuan Road, Haidian District, Beijing, China
Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 200 L.
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAYFUR 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazole, afecta principalmente al sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA regulador del dolor, actúa por contacto e ingestión.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **RAYFUR 200 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil 200L	R.C. (días)	
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidipasis longifolia</i>	200	21	0.005
Arroz	Gusano rojo	<i>Chloronotus xanthus</i>	150	51	0.01
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidipasis longifolia</i>	250	21	0.005
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodidipasis longifolia</i>	150-250	21	0.005
Brócoli	Polilla del brócoli	<i>Putella xylostella</i>	125	7	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturalis</i>	200-250	14	0.02

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también de la etapa de desarrollo del cultivo. Puede ser aplicado como máximo hasta 2 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

RAYFUR 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



15.0 cm