

2.0 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reintegrarse al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes, dentro del producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar el producto en un lugar seco, fresco y en la sombra.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico: Fenil pirazol**
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
SICO TOX Tel: 0800-13340 (Atención 24 horas)
SICO TOX Tel: 0800-145000 Opción 4

En caso de emergencia llamar a:
SICO TOX Tel: 0800-13340 (Atención 24 horas)
SICO TOX Tel: 0800-145000 Opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido sujar el envase 3 veces y vuelta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilizado triturándolo o perforándolo y depositarlo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades.



30.0 cm

RAYFUR 200 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Fipronil 200 g/ L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

FITOCORP SAC

Jr. Las Pioneras N° 147 Dpto. 2B, Urb. La Molina Vieja, La Molina - Lima

Teléfono: 016522183

Formulado por:

BETA CHEMICALS LTD.

Rm. 707, Bld. A, Kingsound Center, N° 116 Zetihuyan Road, Haidian Distrot, Beijing, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 0.25 L

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAYFUR 200 SC es un insecticida que pertenece al grupo de los Fenil-Pirazole, afectando principalmente el sistema nervioso central de los insectos bloqueando el canal GABA, regulador del cloro, actúa por contacto e ingestión.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **RAYFUR 200 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/cil 200L	R.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	300	21	0.005
Aroz	Gusano rojo	<i>Chironomus xanthus</i>	150	51	0.01
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	250	21	0.005
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	150-250	21	0.005
Brócoli	Pollita del brócoli	<i>Plutella xylostella</i>	125	7	0.02
Papa	Gorgoppo de los andes	<i>Pemmotrypes saruticallus</i>	200-250	14	0.02

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también de la etapa de desarrollo del cultivo. Puede ser aplicado como máximo hasta 2 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

RAYFUR 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



15.0 cm