21.0 cm

0.7 cm

0.5 cm

7.7 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es toxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las en las primeras 24 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo Químico: Dinitroanilina
-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 **ESSALUD: 0800-10-828**
CROP BUSINESS S.A.C: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturandolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, plantas acuáticas, plantas semiacuáticas y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

BUNKER 480 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Metribuzin.....480 g/L
Aditivos .....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2181 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C
Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.

Av. Melgarejo Nº 580. Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349 - 2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: **1 L**
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,
Song Jiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BUNKER 480 SC es un herbicida sistémico, que se absorbe por las raíces y también penetra a través del follaje, traslocándose por el interior de la planta. La acción principal se produce sobre los puntos de crecimiento (meristemas apicales) desde donde inhibe la fotosíntesis con el consiguiente marchitamiento y posterior muerte de la maleza tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	MALEZA		DOSIS L/Ha	P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Coquito Grama china Pata de gallina Verdolaga	*Cyperus rotundus* *Sorghum halepense* *Eleusine indica* *Portulaca oleracea*	0.3	28	0.1
Papa	Chamico Lechera Lengua de vaca Yuyo	*Datura stramonium* *Euphorbia hirta* *Rumex crsipus* *Amaranthus hybridus*	0.3 - 0.4	60	0.6

PC: Período de carencia (días) **L.M.R.:** Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar previa evaluación y máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Dosis máxima 0.3 L/ha. En caso la maleza persista, emplear otro plaguicida con diferente mecanismo de acción.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas..

1.2 cm