

CAMPO-LARIN

50 EC

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Lambda-cyhalothrin	50 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,
Miraflores, Lima, Peru
Teléfono: (01) 222 2795



Prolongación Miguel Grau 112. Tiabaya - Arequipa
Teléfono: 054 439101


NO EXPLOSIVO



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- **Grupo Químico: Pyrethroid.**
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente durante un mínimo de 20 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



CAMPO - LARIN 50 EC es un insecticida de contacto, ingestión y repelección de larvas y adultos, interviene en los canales de sodio, causando hiperexcitación, bloqueo nervioso y muerte del insecto. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

Cultivo	Plaga		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	7	0.02

PC: Período de Carença.

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 días.

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

