

# CAMPO-LARIN

## 50 EC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Lambda-cyhalothrin ..... | 50 g/L     |
| Aditivos .....           | c.s.p. 1 L |

Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 222 2795



Calle Enrique Palacios 360, Oficina No 505,  
Miraflores, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 222 2795

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios, no aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**CAMPO - LARIN 50 EC** es un insecticida de contacto, ingestión y repelencia de larvas y adultos, interviene en los canales de sodio, causando hipertextinia, bloqueo nervioso y muerte del insecto. Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

| Cultivo | Plaga        |                              | Dosis (L/Ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|         | Nombre común | Nombre científico            |              |           |           |
| MAÍZ    | Cogollero    | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.4          | 7         | 0.02      |

Aplicar en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo y en presencia de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 7 días.

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

