

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CAMPO - NIL  
720 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Chlorothalonil..... 720 g/L  
TN - GXL (1,2 - Benzisothiazolin - 3- one) ..... 1 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2128 - SENASA

Titular de Registro:

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Magdalena del Mar, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 636 0847

Formulador:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.  
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China.  
Teléfono: + 86-574-87301088

Importador y Distribuidor :

NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.  
Tomás Ramsey N° 930, Oficina 1210,  
Magdalena del Mar, Lima, Peru  
Teléfono: (01) 636 0847

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto : 4 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evite almacenar por encima de 35°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Cloronitrilo**
- En caso de intoxicación, brindar asistencia médica y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106  
NGC AGROSCIENCES PERU S.A.C.: (01) 636 0847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seco a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**CAMPO - NIL 720 SC** es un fungicida de amplio espectro, no sistémico, de contacto y protector de amplio rango de cultivos como hortalizas y otros.

Para su aplicación, mezclar con agua la cantidad necesaria de **CAMPO - NIL 720 SC**, aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestres, tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme. Las aplicaciones foliares deben ser preventivas cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo   | Plaga                |                                 | Dosis     |             | PC (días) | LMR (ppm) |
|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|           | Nombre común         | Nombre científico               | L/200L    | L/Ha        |           |           |
| Espárrago | "Roya del espárrago" | <i>Puccinia asparagi</i>        | 0.350     | -           | 14        | 0.01      |
| Pimiento  | "Tizón temprano"     | <i>Alternaria solani</i>        | 0.4 - 0.5 | 0.7 - 1.25  | 7         | 7         |
| Alcachofa | "Moho gris"          | <i>Botrytis cinerea</i>         | 0.5 - 0.6 | 1 - 1.8     | 1         | 0.01      |
|           | "Pudrición blanda"   | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> | 0.5 - 0.6 | 0.875 - 1.2 | 13        |           |

LMR: Límite Máximo de Residuos.  
PC: Período de carencia.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **CAMPO - NIL 720 SC**.

Para el espárrago se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 2 semanas.

Para el cultivo de pimiento realizar 1 aplicación por campaña por año durante la etapa de crecimiento y desarrollo vegetativo, considerando un gasto de agua de 350 - 500 L/Ha.

Para el cultivo de alcachofa realizar 1 aplicación por campaña por año. Aplicar la dosis menor cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad, y la dosis mayor al presentarse infestaciones iniciales, los primeros síntomas o signos de la enfermedad.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 12 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **CAMPO - NIL 720 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

