

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

XTEND® 50% WP

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

Composición química

Thidiazuron.....500 g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino por ingestión e inhalación. Evitar ingerir y respirar el polvo o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de su casa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylurea.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminados y báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de Inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, entonces dar respiración artificial.
- Nota al médico:
- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de emergencia:

ESSALUD 411 8000 Anexo 4.
CICOTOX 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, destruya el envase, inutilizándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FORMULADOR:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15, Hubu Street, Nanjing, Jiangsu CHINA
Tel: 86-25-86895000

IMPORTADOR:

IPEH
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro
Lima - Perú
Telefax: (511) 2255951- 2267332
www.ipeh.org.pe

® = Marca Registrada por IPEH

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- XTEND® 50% WP es un regulador de crecimiento, cuyo objetivo es elongar el filocladio en el cultivo de espárrago lo que permite tener una mayor área foliar y en consecuencia un incremento en el rendimiento final del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Se recomienda hacer una premezcla con poca agua, obteniéndose una suspensión, luego agregar a esta el resto de agua hasta completar la dosis.
- Para su aplicación deberán utilizarse equipos provistos de sistemas de agitación para mantener una distribución homogénea de XTEND® 50% WP.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Modo de acción	Dosis (Kg/ha)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
Espárrago	Incrementa el área foliar por elongación del filocladio. Mejora el rendimiento propiciando turiones de mayor calibre.	0.01	N.D.	0.01

L.M.R.: Límite máximo de residuos P.C.: Periodo de carencia N.D.: No determinado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Primera aplicación: Emisión de la primera brotación
Segunda aplicación: Emisión de la segunda brotación

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar al área tratada durante un intervalo restringido de 24 horas de finalizado el tratamiento con XTEND® 50% WP.

COMPATIBILIDAD

XTEND® 50% WP es compatible con la mayoría de los agroquímicos más comunes. Incompatible con compuestos alcalinos, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



Instituto Peruano del Espárrago
y Hortalizas

RCP N°029 - SENASA

Titular de registro: IPEH

Fecha de Formulación:

Número de Lote :

Contenido neto : 1 Kg

Fecha de vencimiento:



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

