

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Diftiolane**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 08001 – 3040 (gratuito) 328 – 7398  
ESSALUD EN LÍNEA: 411 – 8000 CISPROMQUIM: 0800 – 50847  
SHARDA PERÚ: 222 – 2695

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inútilcelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



# ISOMASS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**  
Isoprothiolane .....400 g/L  
Aditivos .....csp 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
Calle las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222 – 2695

Formulado por:  
**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Dominic Holm, 29th Road,  
Bandra (W), Mumbai – 400 050 – INDIA  
Telf: (91) 22 6678 2800  
Fax: (91) 22 6678 2828

Importado y distribuido por:



**SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.**  
Av. Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú  
Telf.: (01) 336-8645  
Fax: (01) 336-8299

Contenido Neto: 500ml

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ISOMASS** es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa, cuyo ingrediente activo es Isoprothiolane. Inhibe la penetración y elongación de la hifa. Actúa inhibiendo la biosíntesis de los fosfolípidos, interfiriendo en el crecimiento del micelio y germinación de las conidias, disminuyendo en gran medida los síntomas de la enfermedad.

**ISOMASS** se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. La aplicación se dirige al follaje. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de aplicación. Calibrar el equipo previamente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Esparrago	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5	15	0.01

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar el producto cuando el cultivo se encuentre en la fase de crecimiento vegetativo, especialmente cuando el follaje esté completamente desarrollado y denso y cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad en campo. Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año. Considerando 2 campañas al año. La dosis máxima es de 1.5 L/ha. En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de productos que contienen las mismas características. Se recomienda realizar una mezcla de prueba.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

