

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

##### Grupo químico: Morfolinas, Estrobilurina

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:** Llamar a CICOTOX: 0800-13040. ESSALUD: 0801-10200

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# FUNGIMYL®

## 450 SC

### PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

#### FUNGICIDA AGRICOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICION:

Dimethomorph ..... 300 g/L  
 Pyraclostrobin ..... 150 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 L

REG. PQUA Nº 2198 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y Distribuidor:

Nº de Lote:  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:  
 Contenido  
 Neto: **1 Litro**

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Ltd.

Room 1510, NO 500, Xinjian RD,  
 Shanghai, CHINA.

CAPEAGRO  
 Av. Benavides 2150. Ofic. 803  
 Miraflores - Lima  
 www.capeagro.com

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**FUNGIMYL 450 SC** es un fungicida sistémico y translaminar, con efecto preventivo, curativo y erradicante sobre enfermedades fungosas. Este producto tiene doble modo de acción ya que actúa a través del pyraclostrobin inhibiendo la respiración celular de los hongos a nivel mitocondrial impidiendo la producción de energía; el dimethomorph altera la formación de la pared celular en todos los estados del ciclo de vida del hongo excepto en la formación de zoosporas, además presenta un fuerte efecto antiesporulante. Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **FUNGIMYL 450 SC** luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. Común	N. Científico	%	(L/200 L de agua)		
Cebolla	“Mildiu”	<i>Peronospora destructor</i>	--	0.4	14	0.6* 1.5**
Papa	“Hielo (Rancha)”	<i>Phytophthora infestans</i>	--	0.25 - 0.5	14	0.05* 0.02**
Vid	“Mildiu”	<i>Plasmopara viticola</i>	0.10	--	28	3.0* 1.0**

PC: Período de Carenia; LMR: Límite Máximo de Residuos \*; Dimethomorph \*\*; Pyraclostrobin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda aplicar **FUNGIMYL 450 SC** una vez por campaña, considerando dos campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO:** No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, pero no es compatible con productos muy alcalinos. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de efectuar una mezcla.

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

