

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto bállese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado. Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Clorociflutril
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provocar vómito, pero no evite si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antidoto. Tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX Tel.: 0800-1-3000 (Atención 24 horas)

ESSALUD EN LÍNEA: 471-8000 Opción 4

FTOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertibrados acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SNAPKILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Clofianidif..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
FTOCORP SAC
Jr. Las Ponceanas N° 147 Interior 2B Urb. La Molina vieja, La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:
BETA-CHEMICAL LTD.
Rm. 707, Bld. A, Kingsound Center, No. 116 Zhenyuan Road, Beijing 100097, China
Importado y Distribuido por:



Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SNAPKILL es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Modo de acción IRAC 4A).
Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **SNAPKILL** agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión, con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/200L		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	100-110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Togorhodes orizicolus</i>	-	180	-	-
Espárrago	Prodiplosis	<i>Prodiplosis longifolia</i>	400	180	30	0.04
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.05-0.05%	60-110	14	0.07
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza tuberosari</i>	140-180	40-60	14	0.05
Pimiento	Gorgopio de los pimientos	<i>Pteromyia piperis</i>	-	200-300	14	0.2
	Mosquilla de los brócolis	<i>Prodiplosis longifolia</i>	450-500	-	33	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100-140	40-60	14	0.05
	Mosquilla de los brócolis	<i>Prodiplosis longifolia</i>	300-400	-	7	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	0.05%	-	30	0.7

P.C.: Período de curación

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **SNAPKILL** al inicio de la infestación de la plaga.
Efectuar un máximo, de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días.
En aserrío, aplicar sólo al follaje nunca sobre troncos en cosecha.
En papa para el control de Gorgopio de los Andes iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SNAPKILL es compatible con insecticidas y fungicidas en general, se recomienda rotar con otros insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.

FTOTOXICIDAD

SNAPKILL no es fitotóxico a la dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en la etiqueta y que su eficacia para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



15 cm

30 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lávela la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado. Ningún envase que haya contenido este producto debe utilizarse para contener o transportar alimentos ni agua.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Clorotolmito
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión: no provocar vómito, pero no evitarlo si se produce en forma espontánea.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia y fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- No existe antidoto. Tratamiento sintomático.

En caso de emergencia, llamar a:

CICOTOX TEL: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 111-8000 Opción 4
FIOTOCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destinja este envase y deposítalo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces e invertebrados acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

SNAPKILL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Cloranthin..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:
FIOTOCORP SAC
Jr. Las Ponderinas N°147 Interior 2B Urb. La Molina vieja, La Molina - Lima
Teléfono: 016522182

Formulado por:
BETA-CHEMICAL LTD.
Rm 707, Bk. A, Kingsound Center, No. 116 Zetshuyan Road, Beijing 100097, China
Importado y Distribuido por:

FIOTOCORP

Contenido Neto: 25 Kg

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SNAPKILL es un insecticida con actividad altamente sistémica en la planta, es absorbido rápidamente por las hojas y raíces de las plantas. Controla los insectos por contacto e ingestión afectando su sistema nervioso. (Método de acción IRAC 4A).
Se recomienda llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar **SNAPKILL**, agitar continuamente y completar el resto del agua. Aplicar en forma de aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado, según la dosis del cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/200L		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia waltii</i>	-	100-110	14	0.5
	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Togacodes orizicolus</i>	-	180		
Esparago	Prodiplasis	<i>Prodiplasis longifolia</i>	400	160	30	0.04
Mandarina	Minador de hoja	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.05-0.05g	60-110	14	0.07
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	140-180	40-60	14	0.05
Pimiento	Gorgop de los brócolis	<i>Plutella maculipennis</i>	-	200-300	14	0.2
	Mosquilla de los brócolis	<i>Prodiplasis longifolia</i>	450-500	-	33	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100-140	40-60	14	0.05
	Mosquilla de los brócolis	<i>Prodiplasis longifolia</i>	300-400	-	7	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Dysmicoccus brevipes</i>	0.05%	-	30	0.7

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de Residuos (ppm partes por millón)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **SNAPKILL** al inicio de la infestación de la plaga.
Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo entre 10 a 14 días.
En esparago, aplicar solo al follaje nunca sobre frutos en cosecha.
En papa para el control de Gorgop de los brócolis iniciar la aplicación en la emergencia de las plantas, realizar buena cobertura al follaje.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SNAPKILL es compatible con insecticidas y fungicidas en general, se recomienda rotar con otros insecticidas de diferente grupo químico para evitar resistencia y mantener su eficacia.

FIOTOCORP

SNAPKILL no es tóxico a la dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



15 cm

30 cm

