

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto bállese con abundante agua y jabón, cámbiense y lavar la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y sellado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Este producto es considerado moderadamente irritante a los ojos y sensibilizante a la piel.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Silvicianos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, olvide al paciente al médico y envíele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al Médico: No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
 SICOFOX: 0800-413940 (Atención 24 horas)
 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
 FITOCORP S.A.C.: 016522183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivo de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar designado por las autoridades locales al fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



RONGCUT 757 SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS SOLUBLES EN AGUA - SG

Composición:

Glyphosate ammonium salt..... 757 g/kg

Aditivos..... c.s.p.1kg

Registro PQUA N° - SENASA

Título del registro:
FITOCORP SAC
 Jr. Las Ponderanas N° 147 Interior 2B Urb. La Molina Vieja - La Molina - Lima
 Teléfono: 016522182

Formulador:
Kinnyield Industry Co. Limited
 Unit 905, Workinberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong, China

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 25 Kg
 N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

30 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
 BROWNER 757 SG, es un herbicida sistémico, no selectivo empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hojas anchas, anuales y perennes.
 Para aplicar BROWNER 757 SG, se debe seguir lo siguiente: leer detenidamente en el etiquetado de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y seguir cuidadosamente hasta lograr una mezcla homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	Malezas		Dosis (kg/ha/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Maíz	Vuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>	1-2	1	0,5
	Lectera	<i>Euphorbia hirta</i>			
	Pasco	<i>Chenopodium album</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Arroz	Paja paja	<i>Setaria verticillata</i>	1-2	14	0,5
	Cogollo o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Vuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>			
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>			
Arroz	Verdadaga	<i>Portulaca oleracea</i>	-	14	0,1
	Cogollo o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Moco de pavo	<i>Echinochloa crus-galli</i>			
Arroz	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	-	14	0,1
	Grana	<i>Lepidochloa unipennis</i>			

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite Máximo de Residuo(ppm): partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Usar una aplicación con supervisión dirigida al follaje cuando se note presencia de malezas en los cultivos.

PERÍODO DE REINGRESO.

No reingresar al campo tratado antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto con herbicidas hormonales.

FITOTOXICIDAD

Evitar el contacto con el follaje de plantas cultivadas

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa siguiendo las instrucciones e instrucciones dadas.

