

UNION 72®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN:

Metalaxyl.....80 g/Kg
Mancozeb640 g/Kg
Aditivos c.s.p...1 Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por: **FARMEX S.A.**
Calle Dean Valdivia 148 – Piso 7
San Isidro, Lima 27 – Perú
Teléfono: (01) 630-6400,
Fax (01) 630-6410.

Importador
y distribuidor:



Contenido neto: 1 Kg

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO
CORROSIVO

NO
INFLAMABLE

NO
EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
- DAÑINO -

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar no transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamatos y Acilalaninas.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Si fuera necesario dar respiración artificial.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 0-801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UNION 72 es un fungicida sistémico y de contacto muy eficaz contra hongos del orden Peronosporales. Inhibe el crecimiento del micelio dentro del tejido vegetal, previniendo su esporulación por más de 14 días. Por su acción protectora, también actúa por efecto de contacto contra un amplio espectro de enfermedades.

UNION 72 puede prepararse directamente en el tanque del equipo a utilizar o en el cilindro de preparación. En ambos casos es preferible hacerlo primero en un recipiente aparte, disolviendo la cantidad necesaria de UNION 72 en un poco de agua revolviendo bien hasta conseguir una pasta acuosa uniforme y sin grumos. Luego vierta la mezcla en el tanque del equipo o cilindro de preparación y complete el volumen de agua determinado para la aplicación, agitando o moviendo bien para tener una suspensión uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar UNION 72 (i.e. mancozeb + metalaxyl) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 14 días a más.

Se recomienda aplicar UNION 72 como preventivo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Es recomendable intercalar aplicaciones de fungicidas preventivos.

Para el control de "azul" en tomate con siembra directa, se recomienda aplicarlo en forma de «chorro» al pie de la planta y cuando tenga 5 a 10 cm de altura (6 a 8 días de emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: UNION 72 es compatible con la mayoría de plaguicidas empleados, pero es incompatible con ácidos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: UNION 72 no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: FARMEX S.A. garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

Cultivo	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	2 - 3	--	7	1*/0.5**
Maíz	Mildíu o punta loca	<i>Sclerophthora macrospora</i>	1 - 1.5	0.5 - 0.75	30	0.05
Melón	Mildíu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2 - 3	--	3	1.5* 0.2**
Zapallo	Mildíu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>				
Palto	Tristeza del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	3	0.60	28	7*/0.05**
Papa	Hielo fungoso o ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	--	7	0.3*/0.05**
Tomate	Hielo fungoso Azul	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Phytophthora capsici</i>	2 - 3	--	3	3*/0.2**
Vid	Mildíu	<i>Plasmopara viticola</i>	3	--	66	5*/0.5**

P.C.= Período de carencia en días.

L.M.R. = Límite máximo de residuos en partes por millón

* Mancozeb; ** Metalaxyl.



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

UNION 72®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN:

Metalaxyl..... 80 g/Kg
Mancozeb 640 g/Kg
Aditivos.....c.s.p....1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar no transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamatos y Acilalaninas.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Si fuera necesario dar respiración artificial.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte.
- Teléfonos de Emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 0-801-10200 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. 630-6400.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UNION 72 es un fungicida sistémico y de contacto muy eficaz contra hongos del orden Peronosporales. Inhibe el crecimiento del micelio dentro del tejido vegetal, previniendo su esporulación por más de 14 días. Por su acción protectora, también actúa por efecto de contacto contra un amplio espectro de enfermedades.

UNION 72 puede prepararse directamente en el tanque del equipo a utilizar o en el cilindro de preparación. En ambos casos es preferible hacerlo primero en un recipiente aparte, disolviendo la cantidad necesaria de UNION 72 en un poco de agua revolviendo bien hasta conseguir una pasta acuosa uniforme y sin grumos. Luego vierta la mezcla en el tanque del equipo o cilindro de preparación y complete el volumen de agua determinado para la aplicación, agitando o moviendo bien para tener una suspensión uniforme.

«CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO»

Cultivo	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre Científico	Kg/ha	Kg/cil		
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	2 - 3	--	7	1*/0.5**
Maíz	Mildíu o punta loca	<i>Sclerophthora macrospora</i>	1 - 1.5	0.5 – 0.75	30	0.05
Melón	Mildíu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2 - 3	--	3	1.5* 0.2**
Zapallo	Mildíu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>				
Palto	Tristeza del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	3	0.60	28	7*/0.05**
Papa	Hielo fungoso o rancia	<i>Phytophthora infestans</i>	2 - 3	--	7	0.3*/0.05**
Tomate	Hielo fungoso Azul	<i>Phytophthora infestans</i> <i>Phytophthora capsici</i>	2 - 3	--	3	3*/0.2**
Vid	Mildíu	<i>Plasmopara viticola</i>	3	--	66	5*/0.5**

P.C.: Período de Carencia en días. L.M.R.: Límite Máximo de residuos en partes por millón.

* Mancozeb; ** Metalaxyl.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar UNION 72 (i.e. mancozeb + metalaxyl) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 14 días a más.

Se recomienda aplicar UNION 72 como preventivo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Es recomendable intercalar aplicaciones de fungicidas preventivos.

Para el control de "azul" en tomate con siembra directa, se recomienda aplicarlo en forma de «chorro» al pie de la planta y cuando tenga 5 a 10 cm de altura (6 a 8 días de emergencia).

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: UNION 72 es compatible con la mayoría de plaguicidas empleados, pero es incompatible con ácidos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: UNION 72 no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: FARMEX S.A. garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

Formulado por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia 148 – Piso 7

San Isidro, Lima 27 – Perú

Teléfono: (01) 630-6400,

Fax (01) 630-6410

Contenido neto: 25 Kg

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Importador y distribuidor:



NO
CORROSIVO

NO
INFLAMABLE

NO
EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
- DAÑINO -

