



# Unión 72®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
 POLVO MOJABLE - WP

# Unión 72®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Metalaxyl ..... 80 g/Kg  
 Mancozeb ..... 640 g/Kg  
 Aditivos ..... C.S.P. .... 1 Kg

Reg. PQUA N° ..... -SENASA

Titular de Registro, formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410  
 www.farmex.com.pe

Lote N° :  
 F. For. :  
 F. Venc.:

**CONTENIDO NETO:**  
 1 Kilogramo

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

Titular de Registro, formulado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
 San Isidro, Lima 27 - PERU  
 Teléfono: (01) 630-6400 Fax: (01) 630-6410  
 www.farmex.com.pe

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE  
 DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar no transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Ditiocarbamatos y Acilalaninas.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.
- En caso de inhalación, retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Si fuera necesario dar respiración artificial.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de soporte. EsSalud: 0-801-10200 (gratuito).
- **Teléfonos de Emergencia:** Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita), FARMEX S.A. 630-6400.

POLVO MOJABLE - WP  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 ABRIRA AQUÍ →  
 15.3 cm  
 14.8 cm  
 7.6 cm  
**Unión 72®**  
 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**UNIÓN 72** es un fungicida sistémico y de contacto muy eficaz contra hongos del orden Peronosporales. Inhibe el crecimiento del micelio dentro del tejido vegetal, previniendo su esporulación por más de 14 días. Por su acción protectora, también actúa por efecto de contacto contra un amplio espectro de enfermedades.

**UNIÓN 72** puede prepararse directamente en el tanque del equipo a utilizar o en el cilindro de preparación. En ambos casos es preferible hacerlo primero en un recipiente aparte, disolviendo la cantidad necesaria de **UNIÓN 72** en un poco de agua revolviendo bien hasta conseguir una pasta acuosa uniforme y sin grumos. Luego vierta la mezcla en el tanque del equipo o cilindro de preparación y complete el volumen de agua determinado para la aplicación, agitando o moviendo bien para tener una suspensión uniforme.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVOS	ENFERMEDAD		Kg/ha	Kg/cil	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
CEBOLLA	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2-3	--	7	1.5'0.2"
	Mildiu o Punta loca	<i>Sclerotophora macrospora</i>	1-1.5	0.5-0.75	30	0.05'0.05"
MAÍZ	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2-3	--	3	1.5'0.2"
ZAPALLO	Mildiu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	2-3	--	3	1.5'0.05"
PALTO	Taña del palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	3	0.60	28	7'0.2"
PAPA	Hielo fungoso o rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	2-3	--	7	0.2'0.05"
TOMATE	Hielo fungoso	<i>Phytophthora infestans</i>	2-3	--	3	2.5'0.5"
	Azul	<i>Phytophthora capsici</i>	2-3	--	3	2.5'0.5"
VID	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	3	--	66	1.5'11"

P.C.= período de carencia en días. P.P.M.= Partes por millón. L.M.R.= límite máximo de residuos en partes por millón.  
 \*Mancozeb; \*\*Metalaxyl.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar **UNIÓN 72** (i.e. mancozeb + metalaxyl) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una frecuencia entre aplicaciones de 14 días a más. Se recomienda aplicar **UNIÓN 72** como preventivo o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Es recomendable intercalar aplicaciones de fungicidas preventivos. Para el control de "azul" en tomate con siembra directa, se recomienda aplicarlo en forma de "chorro al pie de la planta y cuando tenga 5 a 10 cm de altura (6 a 8 días de emergencia).

**PERÍODO DE REINGRESO**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**UNIÓN 72** es compatible con la mayoría de plaguicidas empleados, pero es incompatible con ácidos y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

**UNIÓN 72** no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

FARMEX S.A. garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**Unión 72®**

Version 01

QVAKVA BUSINESS S.A.C