

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino pirimidine + Phenylpyrrole
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SCREEN 625 WG es un fungicida de sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa eficaz en el control de Botrytis cinerea en diversos cultivos.

CREEN 625 WG es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos que complementan efectivamente su acción en el control de Botrytis. El cyprodinil, que inhibe la penetración y crecimiento del micelio dentro del tejido de la planta; y fludioxonil, que inhibe la germinación de esporas, desarrollo del tubo germinativo y crecimiento micelial del hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El momento oportuno de su aplicación de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicación de 10-14 días.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg /Ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 - 1.0	7	1.5* 1.0**

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos *Cyprodinil; **Fludioxonil



SCREEN

625 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Cyprodinil	375 g/kg
Fludioxonil	250 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 200 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**