

0.40 cm

0.40 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Miclobutan<sup>®</sup>

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDAD AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**COMPOSICIÓN:**

Myclobutanil ..... 400 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazolés.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la Hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM: 080-050-847,  
FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MICLOBUTAN®** es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y traslocado vía xilema y que posee acción preventiva, curativa y erradicante.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
Capsicum annuum (pimientos, páprika, píquillo)	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
VID	Odiosis	<i>Uncinula necator</i>	200-300 g/ha	14	1

P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. El intervalo de aplicación es de 15 días o más.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**  
Importado y distribuido por:



Reg. PQUA N° 291-SENASA

CONTENIDO NETO: 250 g

Formulado por:  
**JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD**  
Changfengting Road, Nanjing  
Chemical Industrial Park, Luhe,  
Nanjing, China 210047.

Lote N°:  
F.Form.:  
F.Venc.:

**NO CORROSIVO**  
©Marca registrada de FARMEX S.A.

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



15.00 cm

0.40 cm

0.40 cm