

0.40 cm

0.40 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Miclobutan®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDAD AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Myclobutanil 400 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muestrele copia de esta etiqueta y la Hoja informativa adjunta.

TÉLEFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM: 080-050-847,
FARMEX S.A.: (01) 630-6400.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MICLOBUTAN® es un fungicida sistémico, rápidamente absorbido por el follaje y traslocado vía xilema y que posee acción preventiva, curativa y erradicante.

Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
Capsicum annuum (pimientos, páprika, píquillo)	Odiosis	<i>Leveillula taurica</i>	100-150 g/cil	3	0.5
VIDO	Odiosis	<i>Uncinula necator</i>	200-300 g/ha	14	1

P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. El intervalo de aplicación es de 15 días o más.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**
Importado y distribuido por:



Farmex

Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N° 291-SENASA

CONTENIDO NETO: 250 g

Formulado por:
NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD. (J&J)
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street,
Ningbo, China. Código Postal: Zhejiang, 315010.
Teléf.: + 86-574-87301088.

Lote N°:

F.Form.:

F.Venc.:

NO CORROSIVO

©Marca registrada de FARMEX S.A.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



0.40 cm

0.40 cm

15.00 cm