

BLACKOUT® 90% SP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Methomyl.....900 g/Kg

Aditivos.....csp 1 Kg

Reg. PQUA N° 1169 - SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de registro:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS

Formulador:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750

Jinan, Shandong, China

+86-531-88875230

Importador y Distribuidor:

IPEH

Calle 21 Nro 713 Oficina 205 Urb. Corpac

San Isidro - Lima - Perú

Telefax: (511) 2267332- 2255951

www.ipeh.org.pe

Fecha de Formulación:

Número de Lote:

Contenido Neto: **20 Kilos**

Fecha de vencimiento:

® = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es TÓXICO, no ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire (polvo o aspersión)
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Carbamato

- Inhalación: Retire del área de exposición al aire fresco inmediatamente. Obtenga atención médica inmediatamente.
 - Contacto con la piel: Quitar la ropa inmediatamente. Lave las áreas contaminadas con agua y jabón. Obtenga atención médica inmediatamente.
 - Contacto con los ojos: Enjuague los ojos con agua ligeramente tibia durante por lo menos 20 minutos o hasta que se retire el producto. Obtenga atención médica inmediatamente.
 - Ingestión: En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua y obtener atención médica de inmediato. El personal médico calificado debe administrar oxígeno. No le de nada por la boca a una persona inconsciente. Lleve a la persona a un médico inmediatamente.
- Antídoto:
Administrar sulfato de atropina por vía intravenosa o por vía intramuscular si la inyección intravenosa no es posible.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-13040 (Gratuito) ó 328-7398
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de este envase, inutilicelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente toxico para abejas
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil		
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4		1	2
	Copitarsia corruda	<i>Copitarsia corruda</i>		0.2		0.02

L.M.R: Límite máximo de residuos / P.C: Periodo de carencia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLACKOUT 90% SP, es un insecticida de amplio espectro de acción y efecto inmediato, actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistemática ascendente, también es translaminar cuando es aplicado al área foliar.

BLACKOUT 90% SP, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BLACKOUT 90% SP** (i.a. Methomyl) una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas por año.

BLACKOUT 90% SP, debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BLACKOUT 90% SP, es compatible con la mayoría de plaguicidas de su uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

BLACKOUT 90% SP no presenta problemas de fitotoxicidad con los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

