BLACKOUT® 90% SP

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Methomyl......900 g/Kg Aditivos.....csp 1 Kg

Reg. PQUA Nº 1169 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS l itular de registro

Formulador:

Jinan, Shandong, China +86-531-88875230 6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750 SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

Importador y Distribuidor:

Calle 21 Nro 713 Oficina 205 Urb. Corpac Telefax: (511) 2267332- 2255951 San Isidro - Lima - Perú

www.ipeh.org.pe

Fecha de Formulación: Número de Lote:

Fecha de vencimiento Contenido Neto: 1 Kilo

S = Marca Registrada por IPEH

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TOXICO

"LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

lingún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse par servar alimentos o agua para consumo.

RIMEROS AUXILIOS

 Cortado con la piel: Quitar la ropa inmediatamente. Lavo las áreas contaminadas con agua y jabón. Obtenga atendón média inmediatamente.
 Cortado con los obes. Enjuagua los dos con agua li grammente tibla durante, por lo menos 20 minutos o hasta que se retire el producto. Obtenga atención sslacion: Retire del área de exposición al aire fresco irenediatament enga atención médica inmediatamente.

edida himodiataneriet.

figeatien: En caso de ingestien, enjuagar la boea con agua y obtener
fingeatien: En caso de ingestien, enjuagar la boea con agua y obtener
senden medica de inmediato. El personal médico calificado debe administrar
senden medica de inmediato in la boca a una persona incensidante. Lleve a la

dministrar suffeto de atropina por via intravenosa o por via intramuscular . Inyección intravenosa no es posible.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 (Gretuto) ó 328-7398 ESSALUD: 411 8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS Despues de usar el contenido de este envase, inutilicalo perforândolo ; repositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

IEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

merke toxico para abejas aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivo

No contaminar rios, lagos, estanques, arroyos con los desechos o envase No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación icar temprano en la mañana o en las tardes. Eviter la deriva por el vient ligroso para organismos acuáticos.

oermassies. - El aplicador debe emplear todas las medidas nocesarias para controlar li En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente lispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hadia aguas subtern No aplicar en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permiti nimales en el érea tratada.

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

PRECAUCIONES Y ADVERTRICIDA DE USO Y APLICACIÓN Elles productos à TOUCION no injente. Elles productos à TOUCION no injente. Pobade ser ledial di es initialidado Not respire (pròtivo o aspresibiri) — causa intrisació no oberdata a les ejes. — causa intrisació no destada a les ejes. — los comes habres d'amarí d'asurario a las operaciones de mixida y aplicación, — los comes habres d'amarí d'asurario a las operaciones de mixida y aplicación, — Conservor al producto en el renease original, bien laspado y aliquidado, — Después de unas el producto, d'ambieses, liver la 179a contaminata y béfrese titioe ropa protectora durante el manipulaco y aplicación y para ingresar al a tratada en las primetas l'2 incres después de la aplicación. mucenar el produccio bigli ciecio, en ambientes frescos, secos y ventifados. o alimenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicines, des, ni forajes. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO BLACKOUT 90% SP, es un insecticida de amplio espectro de acción y efecto inmediato, actuá por requerido, se agita y se procede a aplicar con do al área foliar.

inidicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen ascedente, también es translaminar cuando es aplica-BLACKOUT 90% SP, se prepara diluyendo la dosis contacto, ingestión y posee actividad sistemática

cualquier equipo de aspersión terrestre. Se recomienda aplicar BLACKOUT 90% SP (i.a. FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

considerando dos campañas por año. Methomyl) una aplicación por campaña como máximo,

BLACKOUT 90% SP, debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo.

No ingrese al área tratada hasta 48 horas después de

PERIODO DE REINGRESO:

BLACKOUT 90% SP, es compatible con la mayoría de plaguicidas de su uso común, excepto con los de COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

reacción alcalina.

fitotoxicidad con los cultivos y dosis recomendadas BLACKOUT 90% SP no presenta problemas de

RESPONSABILIDAD CIVIL

que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se envase correponden a las anotadas en la etiqueta y usa y maneja de acuerdo con las condiciones físicas y químicas del producto contenido en este "El titular del registro garantiza que las características

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

	-	Plaga	Dost	SIS	P.C.	L.M.R.
Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil	(días)	(mpqq)
Denárrado	Trips	Thrips tabaci	0.4		•	2
a Bro madore	Copitarsia corruda	Copitarsia corruda		0.2		0.02

L.M.R: Límite máximo de residuos / P.C: Período de carencia







