

BLUTBAD® 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Pyrimethanil:..... 400 g/L
Aditivos:.....c.s.p. 1 L

PQUAN° 1504 - SENASA

Titular del registro: INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS

Formulador:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA
Teléfono: 86-25-86895000

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro. 713 Oficina 205 – San Isidro - Lima
Teléfono: (01) 2255951

F. de form:

N° Lote:

Contenido Neto: **250 mL** **NO INFLAMABLE**

F. de venc:

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

ESSALUD: 08000 ANEXO 4

CICOTOX: 0800-13040

CISPROQUIM: 0800-50847

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



12,5 cm

GENERALIDADES

BLUTBAD® 40% SC es un fungicida de contacto preventivo y curativo, que se transporta acropetalmente y tiene acción translaminar. Inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infectivo del patógeno.

BLUTBAD® 40% SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión terrestre. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha		
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.7 - 0.8	3	0.05

PC: Periodo de Carencia (días)

LMR: Límites Máximos de Residuos (ppm)

ppm: partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser de 15 días entre aplicaciones.

Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

FITOTOXICIDAD

BLUTBAD® 40% SC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

BLUTBAD® 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Pyrimethanil..... 400.0 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N° 1504 - SENASA

Titular del registro:

Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas

Formulador:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA
Teléfono: 86-25-86895000

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 Nro 713 Oficina 205
San Isidro Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951



F. de form:

N° Lote

Contenido Neto: **250 mL**

F. de venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

Nombre comercial del producto: BLUTBAD 40% SC
Nombre común: Pyrimethanil
Clase de uso: Fungicida agrícola

Reg. PQUA N° 1504 - SENASA

Composición:

Pyrimethanil..... 400.0g/L
Aditivos c.s.p. 1 L


Formula empírica:

C₁₂H₁₃N₃

Peso molecular:

199.28 g/mol

Formula estructural:



Propiedades físicas y químicas del producto formulado

- Apariencia: Líquido
- Color: Beige con olor característico.
- Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Capacidad: 250 mL, 1L, 5L y 20L

Clase de los envases: Botellas/Bidones de HDPE

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD

Este producto es de cuidado, no ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Anilino pirimidinas

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral.

En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco.

Brindar respiración artificial si fuese necesario.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0800 1 3040

ESSALUD: 411 8000 Anexo 4

CISPROQUIM: 0801 050 847

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- No reutilizar los envases.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No permitir animales en el área tratada.

Peligroso para animales domésticos.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o en suelo altamente permeable.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

