

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

Utilice ropa protectora durante el manejo y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No re envasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Anilinoimidazolidina

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.

Si el contacto fuese por la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando ropa y zapatos.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral.

En caso de Inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco.

Brindar respiración artificial si fuese necesario.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0800 – 1 – 3040 / ESSALUD: 411 8000 Anexo 4

CISPROQUIM: 0801-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

- No reutilizar los envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No permitir animales en el área tratada.

Peligroso para animales domésticos.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o en suelo altamente permeable.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

BLUTBAD® 40% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión concentrada (SC)

Composición:

Pyrimethanil 400 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1504 - SENASA

Titular del Registro: IPEH



Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPÁRRAGO Y HORTALIZAS

Calle 21 Nro 713 Oficina 205

San Isidro, Lima - Perú

Teléfono (01) 2267332 / E-mail: contacto@ipeh.org.pe

Contenido Neto: 1 L

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

Formulado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

15 Hubu Street. China. Nanjing. Jiangsu

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLUTBAD® 40% SC es un fungicida de contacto preventivo y curativo, que se transporta acropetalmente y tiene acción translaminar. Inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infeccioso del patógeno. BLUTBAD® 40% SC puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión terrestre. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad / Patógeno		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.7 – 0.8 L/ha	3	0.05

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser de 15 días entre aplicaciones.

Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD:

BLUTBAD® 40% SC es compatible con productos de uso común, excepto con productos ácidos y fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

BLUTBAD® 40% SC en la dosis y uso recomendados no muestra fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

