

USO DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Almacena el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados, máximo por 7 días. Para prolongar la vida útil del producto, mantener en refrigeración entre 4 a 8°C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 2 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto específico, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SOLAGRO SAC: 959966012

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de las aplicaciones o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.

NEMAKONTROL

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

NEMATICIDA AGRICOLA

Composición:

Purpureocillium lilacinum.....1 x 10¹² conidias /Kg
(cepa SCN-11)

AditivosC.S.P. 1Kg

Reg. N° 047 - SENASA - PBA - ACBM

TITULAR DEL REGISTRO:

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C
Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú / gestioncomercial@solagro.com.pe
www.solagro.com.pe

FORMULADO Y DISTRIBUIDOR:

SOLAGRO
SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES
Av. Metropolitana Mz. F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú / gestioncomercial@solagro.com.pe
www.solagro.com.pe
R.C. 934776031 / 99416899 / 958966012

Contenido Neto: 16 Kg

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

NEMAKONTROL (Cepa SCN-11) contiene un aislamiento patógeno natural de *Purpureocillium lilacinum* que se caracteriza por parasitar masas de huevos de nematodos, destruyendo el embrión ya que ejerce fuerte presión sobre la capacidad reproductiva de las hembras de nematodos fitopatógenos como *Meloidogyne sp.* y otros.

LAVADO DE ESPORAS: Por cada bolsa de 800g de **NEMAKONTROL**, preparar una solución de 1 ml de surfactante agrícola en 1 litro de agua, enseguida agregar todo el contenido de **NEMAKONTROL** y agitar la mezcla hasta retirar todas las esporas del maíz; luego colar la solución y las esporas a través de una malla fina para evitar el paso de maíz al tanque (repetir los lavados dos veces más hasta observar el color característico del maíz). Agitar la solución durante la infección para mantener en suspensión las conidias.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis (Kg/Ha)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Nematodo del nódulo de la raíz	<i>Meloidogyne sp.</i>	10	N.A.	N.A.
Pimiento			10	N.A.	N.A.
Vid			10	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carenia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: Se recomienda realizar aplicaciones por sistema de riego en horas de la mañana o de la tarde. Inocular antes del crecimiento de raíces nuevas, entre 1 a 3 aplicaciones por campaña, según el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO: 2 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con fungicidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren la viabilidad del producto.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos que se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCION

