

# HOJA INFORMATIVA PARA GOTERO - Abril 2018 - Formulador: MONTANA

PANTONE 293 C

PANTONE 2935 C

PANTONE RED 032 C

## TIRA

3.12 cm

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS  
DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)



NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIQUIDAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

3.22 cm

## RETIRA

3.12 cm

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Deveñe el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación sobrante del producto o del envase vacío.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No permitir animales en el área tratada.

3.22 cm



3 cm

- Grupo químico: Ácido Giberélico pertenece al grupo químico 15 de Giberelinas.
- Registro: RCP N° XXX-SENASA
- Propiedades físicas y químicas:
- Aspecto: Líquido homogéneo
- Color: Incoloro cristalino a ligeramente amarillito.
- Olor: A alcohol
- pH: 4-8
- Densidad relativa: 0.79-0.830 g/ml
- Persistencia de espuma: 60 ml (1 min)
- Propiedades oxidantes: No oxidante
- Propiedades explosivas: No explosivo
- Inflamabilidad: Inflamable
- Capacidad y clase de los envases: goteros 25 ml, 200 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L, 200 L.

- Titular del registro: MONTANA S.A., Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofc. 401, La Molina, Lima - Perú
- Formulado por: MONTANA S.A., Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofc. 401, La Molina, Lima - Perú
- Distribuidor: MONTANA S.A., Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofc. 401, La Molina, Lima - Perú

3 cm

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ácido Giberélico pertenece al grupo químico 15 de Giberelinas.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está

3 cm

- consiente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con jabón y abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene apague respiración artificial.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
MONTANA: 419-3000  
ESSALUD: 117 o 411-8000 ANEXO 4  
CICOTEX: 0-800-1-3040

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación.
- Luego inutilícelo, inutilizándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.



### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS

| CULTIVO | Momento de aplicación | DOSES (L/200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
| Vid     | Crecimiento de bayas  | 0.125 - 0.20   | Evento    | Evento    |

PC: Periodo de Cacería / LMR: Límite Máximo de Residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Las aplicaciones deberán realizarse durante el crecimiento de las bayas de una vez a mesa.
- Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo entre aplicaciones de 7 a 10 días.

### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

SONAR es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Antes de realizar una mezcla, se recomienda previamente realizar pruebas de compatibilidad.

### ITOTOCIDAD

SONAR no es fitotóxico usado a las dosis y en el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicas/químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

