

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir
- Utilice ropa protectora durante el manejo y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fosforado de ácido fosfónico
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta
  - En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consiente. No provoque vómito.
  - En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.
  - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
  - Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106  
ALBAUGH PERÚ S.A.: (511) 951 313808

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, plantas acuáticas y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# ZIBO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

#### Composición:

Glufosinate-ammonium..... 200 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA No. 1998-SENASA

#### Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

ALBAUGH PERÚ S.A.

Calle Mártir Jose Olaya N°129, Interior 1101,  
Miraflores. Lima - Perú. Tel.: (01) 242 3273

#### Formulador:

ALBAUGH ASIA PACIFIC LTD.

Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street,  
Chai Wan, Hong Kong, China

Fecha de Formulación:

No. de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZIBO® es un herbicida de contacto, no selectivo, que actúa inhibiendo la enzima glutamina sintetasa, produciendo una alteración del metabolismo del amonio, causando la acumulación fitotóxica dentro de la maleza, y ejerciendo su efecto herbicida.

ZIBO® puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo a para conocer el gasto de agua por hectárea. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

Aplicar en capacidad de campo.

Recomendable usar boquilla de abanico plano o cono lleno a presión constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA        |                    | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|--------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO  |               |                |                 |
| Vid     | Verdolaga    | Portulaca oleracea | 2             | 14             | 0.1             |

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar previa evaluación y cuando se detecte la presencia de malezas. Aplicar en forma dirigida y cuando la maleza presente al menos 2 hojas.

Aplicar en capacidad de campo.

Se recomienda como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña/año.

Aplicar como máximo 2.0 L/ha.

Si se requiere una nueva aplicación, emplear herbicidas de diferente modo de acción.

#### PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos químicos altamente reactivos, tales como ácido fuerte, base fuerte, o un agente oxidante fuerte.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

