

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada antes de las 24 horas.
- Evite el contacto con piel, ojos, o el vestido, o respirar los vapores o residuos.
- No permita la presencia de personas sin equipo de protección cerca al área de aplicación.
- Almacene en lugar fresco y seco, bien ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es de cuidado no ingerir.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta
- Grupo Químico: Anilino/primidina
- **Inhalación:** retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial.
- **Contacto con la piel:** remueva cuidadosamente la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- **Contacto con los ojos:** lave los ojos inmediatamente con agua limpia por al menos 15 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
- **Ingestión:** no inducir al vomito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- Antídoto: No tiene antídoto específico
- Tratamiento médico: Suministre tratamiento sintomático y cuidados de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

SAMU: 106

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.: (511) 951 313808

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Los envases utilizados no deben dejarse fuera para evitar su reutilización.
- No arroje los desechos a las corrientes o depósitos de agua ni al sistema de alcantarillas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanque o arroyos con los desechos o envases.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.
- Respetar un banda de no aplicación de agua de al menos (10) metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto al suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su LIXIVIACIÓN hacia aguas subterráneas.
- El aplicador debe emplear todos los medios necesarios para controlar la deriva.

FAISAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Pyrimethanil..... 400 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2067-SENASA

Titular del registro:

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.

Av. Primavera N° 543, Piso 4 - San Borja

Lima - Perú.

Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.

N° 88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan,

Jiangsu 215301 China.

www.rotam.com

Importado y Distribuido por:

SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176 - Lima

Teléfono: 511 336 8299

Fecha de Formulación:

Nº. de Lote:

Contenido neto: 500 ml

Fecha de vencimiento:



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FAISAN es un fungicida formulado con Pyrimethanil. Es un fungicida que inhibe la biosíntesis de la metionina, generando lo que impide la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para el proceso de infección.

FAISAN puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo a para conocer el gasto de agua por hectárea. El producto debe aplicarse previa evaluación de campo. Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis (L/ha)	Dosis (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.30	-	3	0.01
Tomate	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.40	0.20	21	0.05
Cebolla	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	0.5 - 0.6	0.25 - 0.30	14	0.2
Vid	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.20	21	4
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	-	0.20	1	7

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Palto y Vid: aplicar FAISAN al inicio de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar al inicio del periodo de floración del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos químicos altamente reactivos, tales como ácido fuerte, base fuerte, o el agente oxidante fuertes.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

