

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Presenta ligera irritación al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Consultar al médico.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. Llevar al paciente al médico.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.**
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeable.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Orión®

25 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

Composición:

Tebuconazole 250 g/L
Aditivos.....c.s.p..... 1.0L

Reg. PQUA Nº 233-SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Dirección: Room 10-6, Shidai Square, No. 8, Lengjing Street,
Ningbo, Zhejiang, China. Código postal: Ningbo, 315010.

Importado y distribuido por:



CONTENIDO NETO: 200 L

Lote Nº :

F. Form. :

F. Venc. :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

©Marca Registrada por FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ORION® 25 EW es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa que se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

ORION® 25 EW se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

En el cultivo de arroz se recomienda emplear un volumen de 400 L/ha.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivos	Enfermedades		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/cil 200L	(L/ha)		
ARROZ	Quemado o piricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	300	--	35	1,5
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	200-240	0,5 - 0,6	40	0,05
ESPÁRRAGO	Mancha purpura	<i>Sclerotinia vesicarium</i>	200	0,5	40	0,05
	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200-250	--	7	1
PIMIENTO	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100-150	0,4 - 0,6	7	6
VID	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100-150	0,4 - 0,6	7	6

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña, considerando un máximo de 1 campaña por año. El intervalo de aplicación es de 14 días o más. Aplicar a la presencia de los primeros síntomas, y en zonas endémicas cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este periodo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

ORION® 25 EW no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Versión 02



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



GYAKIVA BUSINESS S.A.C