HADONE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRUPO QUÍMICO: Triazoles
FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)
N° DE REGISTRO: PQUA N° XXXX- SENASA
NOMBRE COMÚN: Flutriafol
NOMBRE QUÍMICO:
(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol
FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA:
$C_{16}H_{13}F_2N_3O$
PESO MOLECULAR:
169.1 g/mol.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:
Aspecto: líquido
Color: Blanco
Olor: Olor especial
Densidad: 1090 g/L
pH: 6-9
COMPOSICIÓN:
Flutriafol 250 g/L
CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:
Tipo: cilindro, frascos
Material: PEAD
Capacidad: cilindro x 200 L; frascos x 250 ml y 1L

FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS
FARMAGRO S.A
Av. Alfredo Mendiola 6068.Los Olivos – Lima
Central: (051-1) 614-1500

Fabricante y Formulador:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es DAÑINO no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o furmar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambiese. lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE APLICACIÓN:
Para realizar la mezcla: Protección total, use guantes, anteojos de protección, respirador, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.
Para realizar la aplicación: Protección total, use guantes, anteojos de protección, respirador, overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo y utilice peto o delantal.

INTRUCCIONES PARA EL BUEN ALMACENAMIENTO:
Almacene en lugares que tengan baja humedad, a temperatura normal y con buena ventilación. No arrumar más de cinco cajas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazoles.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado y lavar completamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar ventilado y aplique respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0800-13040
ESSALUD 0801-10200 (las 24 horas); CIPROSQUIM 0800-50847
FARMAGRO 614 1500

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el sitio destinados por las autoridades locales para este fin para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES PARA LAVAR EL EQUIPO DE APLICACIÓN:
Después del uso diario, enjuague el tanque de pulverizador, la bomba, la mochila y mangueras con agua limpia. Limpie el filtro y boquillas. Vacíe el tanque y deje que se seque. Use un cepillo u otro material suave para limpiar la punta de la boquilla. Nunca utilice un pedazo de alambre, una puntilla u otro objeto de metal ya que estos dañan dañarán el orificio y distorsionarán el patrón de aplicación e incrementarán el caudal de salida de la boquilla.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HADONE es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol en los hongos causando el colapso de la pared celular y evitando el crecimiento hifal. Se absorbe por follaje y se trasloca acrópetamente por el xilema y no se acumula en el sitio de entrada.

HADONE se aplica en aspersión con equipos convencionales de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación y mover hasta obtener una mezcla homogénea. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. Realizar la aplicación dirigida al follaje de manera uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha		
Vid	"Oidium"	*Erysiphe necator*	0.250	14	0.8

P.C.: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicar **HADONE** hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año para vid.
- Debe aplicarse cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad, desde desarrollo vegetativo hasta fructificación.

PERIODO DE REINGRESO
No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
HADONE es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD
HADONE no es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.