

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es **DANINO** no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese. lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y calzado contaminado y lavar completamente la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar ventilado y aplique respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0800-13040
ESSALUD 0801-10200 (las 24 horas); CIPROSQUIM 0800-50847
FARMAGRO 614 1500

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en el sitio destinados por las autoridades locales para este fin para evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

HADONE

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN

Flutriafol.....250 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

REGISTRO PQUA N° SENASA

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500 / Fax: 614-1517

Fabricante y Formulador:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.
No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang
District, Shanghai, China.

CONTENIDO NETO: **1L**
LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HADONE es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol en los hongos causando el colapso de la pared celular y evitando el crecimiento hifal. Se absorbe por follaje y se trasloca acrópetamente por el xilema y no se acumula en el sitio de entrada.

HADONE se aplica en aspersión con equipos convencionales de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación y mover hasta obtener una mezcla homogénea.. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. Realizar la aplicación dirigida al follaje de manera uniforme.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha		
Vid	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.250	14	0.8

P.C.: Periodo de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (mg/kg)

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar **HADONE** hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña al año para vid.
- Debe aplicarse cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, o cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad, desde desarrollo vegetativo hasta fructificación.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

HADONE es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, excepto con los agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

HADONE no es fitotóxico a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

