

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Virtuox[®]
WP

PLAGUICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA


FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Polyoxin B..... 11%
Aditivos c.s.p.100%

Reg. PBUA N° 223 - SENASA



Point

ENTREGAMOS
CALIDAD

Titular del registro: POINT ANDINA S.A.

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.

Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: 348-1018 / 349-9609

Formulado por:
XI'AN BEINONGHUA CROP
PROTECTION CO. LTD.

N° 8, Dongfeng Road, Weiyang District,
Xi'An, China

Contenido Neto: 200 g

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE
USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la preparación de la solución.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua por 15 a 20 minutos, remover los lentes de contacto si los hubiera. Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, beber y enjuagar la boca con abundante agua. No administrar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y enjuagar la piel con abundante agua por 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado. Si la persona tienen dificultad para respirar, dar respiración artificial.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106;
POINT ANDINA S.A.: (01) 348 1018

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VIRTUOX WP es un fungicida biológico de amplio espectro de control, tiene acción de contacto y sistémico.

VIRTUOX WP inhibe la síntesis de la quitina presente en la pared celular del hongo, evitando la germinación de las esporas, así como el crecimiento del tubo germinativo.

Modo de empleo

Para su aplicación, mezclar las dosis recomendadas en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones/campaña para alcachofa, granado, pimiento y vid, con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones. Para estos cultivos se tiene 1 campaña/año, a excepción del pimiento que puede tener hasta 2. Aplicar cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los que tienen reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.75	N.A	N.A
Granado	“Mancha negra de la hoja”	<i>Alternaria alternata</i>	0.5-0.6	-	N.A	N.A
Pimiento	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.5	-	N.A	0.3
Espárrago	“Roya”	<i>Puccinia asparagi</i>	0.25	-	N.A	N.A
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.75 - 1.0	N.A	0.3
	“Botrytis”	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.0		

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón). N.A: No aplica

