

17.6 cm

PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo Químico: Cloronitrilo.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, inducir al vómito (si es que la persona estuviese consciente).
- No dar de beber nada a una persona que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación, se deberá dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencias llamar a:
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD : 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al campo de cultivo.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No utilizar este envase para conservar alimentos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Líquido blanco
Color : Blanco
Olor : Ligeramente químico
pH : 5,0 - 8,5
Densidad : 1.24 - 1.29
Producto inflamable: No inflamable

PRESENTACIONES COMERCIALES:

200 g, 500 g, 1 kg.

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por: :

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304

Urbanización Santa Patricia. II Etapa.

La Molina. Lima, Perú.

Teléfono: 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED.

Wan Shi Town,

Yixing, Jiangsu, 214217, China.

Tel. (86 - 510) 87851001

POLVORIN 75 PM®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Reg. PQUA N°110-SENASA

"VENTA SOLO CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Composición :

Clorotalonil 750 g/Kg
Aditivosc.s.p 1Kg

Grupo químico:

Aromáticos policlorinados.


Nombre químico(IUPAC):

Tetrachloroisophthalonitrile

Fórmula empírica, peso molecular

C₆Cl₄N₂
PM=265.9

Fórmula estructural



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



Point
ENTREGAMOS CALIDAD



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

• Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados

• No comer, no beber ni fumar durante y después de la operación sin haberse lavado con agua y jabón.

• Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinales de uso humano o veterinario.

•No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.

• Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.

•Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre.

•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

POLVORIN 75 PM es un fungicida de amplio espectro para tratamientos preventivos y curativos en diferentes cultivos como hortalizas y otros. Para su aplicación, mezclar con agua la cantidad necesaria de POLVORIN 75 PM, aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre, tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

Las aplicaciones foliares deben de ser preventivas cuando se presente las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

POLVORIN 75 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES POR CAMPAÑA/AÑO:

2 aplicaciones campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

POLVORIN 75 PM es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

POLVORIN 75 PM es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC días	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	g/200L		
Alcachofa	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	1.8 - 2.4	600 - 800	1	0.01
Apio	"Viruela del apio"	<i>Septoria apii</i>	2.4	800	7	15
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	2.1	700	14	0.5
Espárrago	"Cercospora"	<i>Cercospora asparagi</i>	1.8 - 2.4	600 - 800	15	0.1
Marigol	"Tizón temprano"	<i>Alternaria sp.</i>	1.8	600	7	5
Melón	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.8	600	7	5
Papa	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	2.1	700	3	0.1
Paprika	"Moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.8 - 2.1	600 - 700	7	0.01
Tomate	"Hielo o Racha"	<i>Phytophthora infestans</i>	2.1	700	3	5

PC: Periodo de Carenia

LMR: Limite Máximo de Residuos (partes por millón)

N.d: No determinado



13.4 cm