

# CUPROFIX DISPERS 42 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**COMPOSICIÓN:** GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**Mancozeb** ..... 300 g/kg  
**Copper (Bordeaux mixture)** ..... 120 g/kg  
**Aditivos** ..... c.s.p. 1 kg

**Registro PQUA No 2243-SENASA**

**Titular del Registro:**

**UNITED PHOSPHORUS PERU SAC**

Calle Los Tulipanes N° 147, Of. 304, Santiago  
de Surco, Lima 33- Perú. Telf.: + 511 7194085



**Formulador:**

**CEREXAGRI.**

Siège social. Paec St Christophe - Galilée 3  
Niveau 1 - 10 avenue de l'Enterprise 95863  
Cergy Pontoise Cedex - FRANCE.  
Tel. +33(0)1 30 178800

**Importado y distribuido por:**

**AGRITOP S.A.C**

Av. Los Gorriones 130 Urb. La Campiña,  
Chorrillos-Lima-Perú  
Telf. 719-1717 / 719-1718



**CONTENIDO NETO:**

**5 Kg**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Carbamate y Inorganic compound.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0800 13040**

**ESSALUD: 0801 10200**

**UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.: 7194085**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- “Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- “Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”.
- “No aplicar en época de floración del cultivo”.
- “No aplicar en presencia de polinizadores”. “No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños”.
- “Aplicar temprano en la mañana o las tardes” “Evitar la deriva por el viento”.
- “Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas”.
- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”. “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”. “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”. “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**CUPROFIX DISPERS 42 WG** es un fungicida de contacto o preventivo. Actúa formando una capa protectora sobre el follaje de los cultivos. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del tubo germinativo.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

La aplicación es por aspersión foliar terrestre. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **CUPROFIX DISPERS 42 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| Cultivo                                   | Plaga          |                               | Dosis kg/200L | P.C. | L.M.R.           |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|------|------------------|
|                                           | Nombre común   | Nombre científico             |               |      |                  |
| Vid<br>( <i>Vitis vinifera</i> )          | Mildiu         | <i>Plasmopara viticola</i>    | 0.5 - 0.75    | 28   | * 5.0<br>** 50.0 |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> )      | Hielo (Rancha) | <i>Phytophthora infestans</i> | 1.0 - 1.25    | 3    | * 0.3<br>** 5.0  |
| Tomate<br>( <i>Solanum lycopersicum</i> ) | Hielo (Rancha) | <i>Phytophthora infestans</i> | 1.0 - 1.25    | 25   | * 3.0<br>** 5.0  |

\* Mancozeb \*\* Copper

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar el producto en etapa de maduración de la papa (3 meses), desarrollo vegetativo del tomate y vid, y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de los mismos.

Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de utilizar con otros productos.

**FITOTOXICIDAD:**

**CUPROFIX DISPERS 42 WG** no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

“El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

