

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

CUPROFIX DISPERS 42 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Mancozeb 300 g/kg
Copper (Bordeaux mixture) 120 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2243-SENASA

Titular de Registro:

ARYSTA LIFESCIENCE PERU S.A.C.

Jr. Caracas Nro. 2226 Fnd. Oyague (altura cdra 3
San Felipe) Jesús María - Lima. Teléfono (01) 5137200



Formulador:

UPL LIMITED.

Uniphos House, Madhu Park, 11 th Road Khar (West),
Mumbai (Bombay) 400 052, India.
Tel. 91-22-2646 8000 Fax 91-22-2604 100
www.uplonline.com

Importador y distribuidor:

AGRITOP S.A.C

Av. Los Gorriones 130 Urb. La Campiña, Chorrillos-Lima
Perú. Telf. 719-1717 / 719-1718



Fecha de Formulación:

No. de Lote:

CONTENIDO NETO: **5 kg**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbamate e Inorganic compound.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
 Teléf. del titular: (01) 5137200
 CISPROMQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CUPROFIX DISPERS 42 WG es un fungicida de contacto o preventivo. Actúa formando una capa protectora sobre el follaje de los cultivos. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del tubo germinativo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

La aplicación es por aspersión foliar terrestre. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **CUPROFIX DISPERS 42 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5 - 0.75	28	* 5.0 ** 50.0
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.25	3	* 0.3 ** 5.0
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.25	25	* 3.0 ** 5.0

* Mancozeb ** Copper

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto en etapa de maduración de la papa (3 meses), desarrollo vegetativo del tomate y vid, y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de los mismos. Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de utilizar con otros productos.

FITOTOXICIDAD

CUPROFIX DISPERS 42 WG no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

