

CUPROFIX DISPERS 42 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Mancozeb 300 g/kg
Copper (Bordeaux mixture) 120 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro Nacional PQUA N° SENASA

Titular del Registro: UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.
Calle Los Tulipanes N° 147, Of. 304, Surco, Lima 33 - Perú. Telf.: +511 7194085

CONTENIDO NETO: **10 Kg**

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Formulado por:

CEREXAGRI.
Siège social. Parc St Christophe -
Galilée 3 - Niveau 1
10 avenue de l'Entreprise 95863
Cergy Pontoise Cedex - FRANCE.
Tel. +33(0)1 30 178800.



Importado y Distribuido por:

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos-Lima
Teléfono: (01) 6141500 Fax. (01) 6141517

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Carbamate y Inorganic compound.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800 13040

ESSALUD: 0801 10200

UNITED PHOSPHORUS PERU S.A.C.: 7194085

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- “Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Tóxico para abejas y artrópodos benéficos”.
- “No aplicar en época de floración del cultivo”.
- “No aplicar en presencia de polinizadores”. “No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños”.
- “Aplicar temprano en la mañana o las tardes” “Evitar la deriva por el viento”.
- “Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas”.
- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos”. “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”. “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros”.
- “Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre”. “No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva”. “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CUPROFIX DISPERS 42 WG es un fungicida de contacto o preventivo. Actúa formando una capa protectora sobre el follaje de los cultivos. Inhibe la germinación de esporas y detiene el crecimiento del tubo germinativo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La aplicación es por aspersión foliar terrestre. Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad de agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **CUPROFIX DISPERS 42 WG**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, mantener agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis kg/200L	P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico			
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	0.5 - 0.75	28	* 5.0 ** 50.0
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.25	3	* 0.3 ** 5.0
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Hielo (Rancha)	<i>Phytophthora infestans</i>	1.0 - 1.25	25	* 3.0 ** 5.0

* Mancozeb ** Copper

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto en etapa de maduración de la papa (3 meses), desarrollo vegetativo del tomate y vid, y cuando se observe los primeros síntomas de la plaga en el cultivo o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de los mismos.

Realizar 2 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 10 a 15 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con plaguicidas comúnmente usados en los cultivos indicados en la etiqueta. Sin embargo, se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad antes de utilizar con otros productos.

FITOTOXICIDAD:

CUPROFIX DISPERS 42 WG no es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular de Registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

