

AMICAL® 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Azoxystrobin, 500 g/kg y Aditivos, csp 1 kg

Reg. PQUA N° 806-SENASA

Titular del Registro:

ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Importador y Distribuidor:

AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000



Formulado por :

BETA CHEMICAL LTD

Room 707, Blk. A, Kingsound Center, N°116 Zizhuyuan Road,
Beijing 100097, China.

IDENTIDAD DE LA MOLÉCULA:

Nombre común


Azoxystrobin

Nombre químico (IUPAC):

Methyl (2E)-2-(2-([6-(2-cyanophenoxy)
pyrimidin-4-yl]oxy)phenyl)-3-ethoxyacrylate

Formula empírica: C₂₇H₂₁N₃O₅

Formula estructural:



PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO:

Apariencia: Sólido Color: Beige marrón Olor: No tiene olor característico

pH: 5 - 8 a 25°C Densidad: 0.499 g/ml a 25 °C

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Tóxico por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante, al tacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.
- No almacenar en casas de habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características del Equipo y Ropa de Protección: Los operarios deberán llevar ropa protectora y equipos de aplicación en perfectas condiciones.

Almacenamiento: Almacenar el producto en sus envases originales, etiquetado y debidamente cerrados en lugares secos y ventilados, bajo llave, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No utilizar, derramar o almacenar el producto cerca de fuentes de calor o fuego.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Estrobilurina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

•NOTA AL MÉDICO:

- Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

•Teléfono de emergencia:

SAMU: 106; . ADAMA AGRICULTURE PERU S.A. (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos, con los restos de la aplicación, sobrantes o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.

MODO DE ACCIÓN

El azoxystrobin es un fungicida sistémico de acción protectante, curativo y antiesporulante. Tiene un sistema lenta, se mueve principalmente de forma traslaminar, algo acropétala.

MECANISMO DE ACCIÓN

El azoxystrobin inhibe la respiración mitocondrial bloqueando el transporte de electrones

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Azoxystrobin tiene óptima eficacia cuando se aplica preventiva o tempranamente en la aparición de síntomas por su control a la germinación de esporas.

AMICAL 50 WG se emplea en pulverizaciones en mezcla con agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, utilizando gotas finas y el volumen de agua suficiente para cubrir uniformemente el follaje.

Los equipos de aplicación deben estar en perfectas condiciones. Asegúrese que los equipos de aplicación no goteen o tengan escape del preparado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	kg/ha		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium versicarium</i>	0.1	0.25	100	0.04
Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.06 - 0.08	-	3	3
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.1	-	14	2

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

Volumen de aplicación: 400 L/ha para cultivo de vid y entre 200 - 500 L/ha para páprika.

Revise los filtros, boquillas, mangueras, empaques, ajustes de las mangueras, palanca y émbolo para que funcionen con precisión antes de comenzar los trabajos.

Periodo de reingreso: 24 horas

Intervalo anterior de la cosecha: 100 días.

Frecuencia y época de aplicación:

Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad:

- Una (01) aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año para páprika.
- Máximo dos (02) aplicaciones por campaña, considerando una (01) campaña para vid y dos (02) campañas para espárrago.

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en las dosis y cultivos recomendados.

Efectos sobre otros cultivos: Ninguno

Efectos sobre cultivos sucesivos: Ninguno

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el

Ur: 25022020 V2



Ancho: 18,3 cm

Alto:14 cm

HOJA INFORMATIVA