

1.3 cm

7.5 cm

ETQ0010

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenaje de alimentos, agua o bebidas.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fenilpirazol
- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar al médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión, lamer inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua la paciente. No inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antidoto específico, su tratamiento es sintomático

Teléfonos de emergencia:
SAMU: 106
GOLDER S.A.C.: 998128710

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos de los envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



REVANCHA® 200SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fipronil 200 gr/L

Aditivos C.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°2170 - SENASA

Titular del Registro:

GOLDER S.A.C.

Av. La Encalada 1420 - Of. 501 Urb. Lima Polo Hunt Santiago de Surco, Lima - Perú.

Formulado por:

Beta Chemicals Ltd.

Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhu Yuan Road, Haidian District, Beijing, China

Distribuido por:



Contenido Neto: 250 ml

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



21.10 cm

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REVANCHA 200 SC es un insecticida Fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En papa se recomienda la aplicación dirigida al cuello de la planta.

REVANCHA 200 SC actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hipereexcitabilidad y convulsiones.

Preparación de la mezcla: Vierta la cantidad de REVANCHA 200 SC en un tanque de mezcla que contenga la mitad de agua, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	21	0.005
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>			
Café	Broca del café	<i>Hypothenemus hampei</i>	0.2	7	0.005
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2-0.25	14	0.02
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.2	21	0.005
Frijol	Langosta migratoria del Perú	<i>Schistocerca gregaria</i>	0.2-0.25	14	0.005
Papa	Gorgojo de los tuberos	<i>Premnotypes vorax</i>	0.2-0.25	14	0.02
Maíz	Langosta migratoria del Perú	<i>Schistocerca gregaria</i>	0.2-0.25	90	0.005
Vid	Barrenillo	<i>Scolytus rugulosus</i>	0.1-0.2	60	0.005

P.C: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se debe evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de REVANCHA 200 SC. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año para control de *Premnotypes vorax*.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

REVANCHA 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

REVANCHA 200 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

