30.0 cm

2.0 cm

15.0 cm

" LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Fenil pirazol

- En caso de intoxicación, inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15-20minutos. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente a un médico, suministre un vaso de agua al paciente, NO inducir al vómito.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
FITOCORP S.A.C: 016522183

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismo acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5m hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades.

REVANCHA 200 SC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Fipronil .....200 g/ L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 2170 - SENASA

Titular de Registro:
FITOCORP SAC
Calle Los Aperos N° 102 Urb. La Ensenada - La Molina - Lima.
Teléfono: 016522183

Formulado por:
BETA CHEMICALS LTD.
Rm. 707, Blk. A, Kingsound Center, N° 116 Zizhuyuan Road, Haidian District, Bejining, China

Importador y Distribuidor:
Calle Los Aperos N° 102 Urb. La Ensenada - La Molina - Lima.

FITOCORP

Contenido Neto: 200 L
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAYFUR 200 SC es un insecticida Fenilpirazol de acción sistémica y de amplio aspectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto recidual sobre insectos del suelo y follaje. En papa se recomienda la aplicación dirigida al cuello de la planta.

RAYFUR 200 SC actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido g-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexitabilidad y convulsiones.
Preparación de la mezcla: Vierta la cantidad de **RAYFUR 200 SC** en un tanque de mezcla que contenga la mitad de agua, luego complete el volumen de aguay agite la mezcla hasta que sea homogénea.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L		
Espárrago	Thrips	*Thrips tabaci*	0.2	21	0.005
	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*			
Café	Broca del café	*Hypothenemus hampei*	0.2	7	0.005
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	0.2-0.25	14	0.02
Pimiento	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	0.2	21	0.005
Frijol	Langosta migratoria del Perú	*Schistocerca piceifrons peruviana*	0.2-0.25	14	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	*Premnotrypes vorax*	0.2-0.25	14	0.02
Maíz	Langosta migratoria del Perú	*Schistocerca piceifrons peruviana*	0.2-0.25	90	0.005
Vid	Barrenillo	*Scolytus rugulosus*	0.1-0.2	60	0.005

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación **RAYFUR 200 SC.** También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña y año para el control de *Premnotrypes vorax.*

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD
RAYFUR 200 SC es compatible con la mayoría con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD
RAYFUR 200 SC no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSBILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.