

Rankil® 3% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

Composición:

Phenthoate: 30 g. / kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2092

TITULAR DE REGISTRO
Y DISTRIBUIDOR:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. de los Ingenieros 230. Urb. Residencial
Ingenieros. La Molina, Lima- Perú
Tel: 013496805

FORMULADOR:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

Contenido neto: 25 kg

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

● = marca registrada por ITAGRO S.A.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Evitar que el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada excepto agua. Si la persona está inconsciente o padeciera convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y déjela en un lugar fresco y ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: sulfato de atropina.
- Teléfonos de emergencia:
- CICOTOX: 328-7398
- ESSALUD: 411-8000 anexo 4.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligros para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Evitar que el producto sea empleado para fines que no estén contemplados en el control de plagas.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los silos destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RANKIL 3% PS es un insecticida foliar que actúa por contacto e ingestión controlando insectos indicados en el cuadro de uso.

Se recomienda realizar la aplicación en espolvoro usando el producto tal como viene preparado usando espolvoro o arena fina, pulverizándolo directamente a las plantas en emergencia, a cuello de planta, en el crecimiento vegetativo inicial. Cuando se observa ataques iniciales de la plaga.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña por año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda un intervalo de 24 horas entre la aplicación y el reingreso a las áreas tratadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros agroquímicos, pero se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad, sobre todo los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

Puede ser fitotóxico a algunas variedades de algodón, uva, manzana, higo y melocotón.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a los anotados en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN ASESOR TÉCNICO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS kg/ha	Periodo de Carenzia (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TÉCNICO			
MAIZ	"Gusano de Tierra"	<i>Feltia experta</i>	10	21	0.01
ESPARRAGO	"Mosquilla del brote"	<i>Prodiplosis longifolia</i>	25	n.d.	0.05

LMR: límite máximo de residuos en ppm.

n.d.: no determinado

