36 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

KAHUNA®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Mancozeb ..... 640 g/Kg
Cymoxanil ..... 80 g/Kg
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cymoxanil. Cyanoacetamide Oxime; Mancozeb: Ditiocarbamatos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito a una persona inconsciente, solicitar ayuda, llamar al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y ventilado, brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Lleve al paciente inmediatamente al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: INAP: (01) 499-7831; SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de no menos de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

KAHUNA es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa. Actúa como inhibidor de múltiples procesos (actividad multisitio) en patógenos. Para la aplicación del producto, se debe llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada y completar con agua, mezclar uniformemente y aplicar sobre el área de la planta a tratar. Realizar la aplicación con un equipo de aspersión manual o mecánico, en óptimas condiciones.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L		
Cebolla	Mildiú	*Peronospora destructor*	1	0.5	7	1.5* 0.05**
Papa	Hielo (rancha)	*Phytophthora infestans*	1 - 1.5	0.5	7	0.2* 0.05**
Pimiento	Tizón temprano	*Alternaria solani*	1 - 1.25	0.5	7	5* 0.05**
Tomate	Hielo (rancha)	*Phytophthora infestans*	1.5 - 2	0.5	3	2.5* 0.2**
	Tizón temprano	*Alternaria solani*	1 - 2	0.5	3	2.5* 0.2**
Vid	Mildiú	*Plasmopara viticola*	2	0.5	18	1.5* 0.3**

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón) *Mancozeb;**Cymoxanil

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: KAHUNA puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo y cuando las condiciones climáticas sean favorables al patógeno. Realizar máximo 2 aplicaciones/campaña/año en papa, pimiento y tomate; y 1 aplicación/campaña/año en cebolla y vid.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: KAHUNA es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: KAHUNA no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

Titular del registro: INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Calle Los Tulipanes 147 Oficina 701-B.
Santiago de Surco, Lima – Perú.
Teléfono: (01) 499-7831

Formulado por: YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.
Wanshi Town, Yixing City,
Jiangsu Province, China 214217

Importado y distribuido por: PERÚ PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.C.
Av. Nicolás Arriola 2374
San Luis, Lima, Perú
Teléfono: (01) 547-0638

Reg. PQUA Nº 2241 - SENASA

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 25 Kg
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

40.8 cm