

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo o la aspersión.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío o para almacenar bebidas, ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quite la ropa y lávela la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / FARMAGRO: 614 1500
CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar, el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar conjuntamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas y plantas acuáticas, y ser acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuencas de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AMARELO 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Pendimethalin 400 g/L
Aditivos csp. 1L

Registro PQUA N° 1155 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.

Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.A. Huancayo Est.
(Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huancayo - San Antonio
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO 嘉農
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

FORMULADOR:
JIANGSU FLUAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
N° 105, Chengsheng, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, China.

Contenido Neto: 10L

Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AMARELO 400EC es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces causándoles la muerte.

AMARELO 400EC, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto u completar el volumen de la aplicación. Sanforar el equipo previamente. Aplicar al suelo, cuando el campo se encuentre en capacidad de campo, de lo contrario realizar un riego posterior a la aplicación. Usar boquillas de tipo plano.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	Período de Carenza (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
CEREALES	Pata de gallina Verdeca Yuyo Pega Pega	<i>Echinochloa</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Setaria verticillata</i>	2.5	60	0.05
	Amor seco Verdeplaga Yuyo	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	2.4 (*)	60	0.05
ALCACHOFA	Amor seco Hierba de gallinazo Chamico Verdeplaga Pega Pega Coquito	<i>Bidens pilosa</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cyperus rotundus</i>	2.0**	200	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos. (*) Gasto de agua: 200L/Ha

**gasto de agua máx. 400L/Ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación.
- Realizar como máximo 1 aplicación por la campaña. Considerando 2 campañas al año (en el cultivo de cebolla).
- En el cultivo de alcachofa se recomienda una sola aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.
- En caso de requerir una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

AMARELO 400EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

