

15 cm

- ### PRIMEROS AUXILIOS.
- Grupo químico: Carbamato
 - En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos.
 - En caso de inhalación, sacar al paciente al aire fresco.
 - En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
 - No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

- Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces e invertebrados acuáticos no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



SULMAT 480 EC es una molécula que pertenece al grupo químico Carbamato, cuyo ingrediente activo es Carbosulfan. Es un insecticida sistémico con acción de contacto e ingestión. Inhibidor de la colinesterasa.

SULMAT 480 EC se debe aplicar cuando se presenten los primeros ataques del insecto. Las aplicaciones se deben ser realizadas en las primeras horas del día o al atardecer, sin presencia de precipitaciones o vientos fuertes que provoquen la deriva del producto. Para la preparación de la mezcla , llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado agitando constantemente.

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha	L/Li		
Cebolla	Trips	<i>Trips tabaci</i>	0.4	0.6	20	0.01

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón)

Se recomienda no aplicar mas de 1 aplicación año por año. La aplicación puede ser dirigida al pie de la planta o al follaje. No aplicar en épocas de floración.

No reingresar al campo antes de las 48 horas de aplicado el producto.

SULMAT 480 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y con productos de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda una prueba de compatibilidad previa.

No presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendados en la etiqueta.

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



30 cm