

ADAMA

Glyphogan®
48 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN :
Glyphosate (Sal IPA) 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Agan Ltd.
Northern Industrial Zone
P.O. Box 262, Ashdod 77102, Israel.

CONTENIDO NETO: 5 Litros
Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - Utilizar ropa y equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto y para ingresar al área tratada.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Después de usar el producto cámbiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
 - Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Glicinas
 - En caso de ingestión, llame o acuda al médico inmediatamente y muestre la etiqueta y la hoja informativa. No induzca al vómito, a no ser que sea voluntario o recomendado por el médico.
 - En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Buscar ayuda médica. Mostrar la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar con un médico. Mostrar la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada inmediatamente lavarse con abundante agua y jabón. Consulte a un médico. Mostrar la etiqueta y hoja informativa del producto.
 - NOTA AL MÉDICO: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; ESSALUD: (01)411-8000 anexo 4

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

Aplicar con equipos de pulverizaciones terrestres de alto volumen y de preferencia usar boquillas de cono hueco. Utilizar un volumen de agua entre 200 - 400 L/ha dependiendo de la cobertura de malezas en el cultivo. Mantener el campo con humedad para mejorar la acción del producto. Antes de iniciar la aplicación asegurarse que el equipo de pulverización se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”				
CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Caña de azúcar	Paico (Chenopodium album), Hierba gallinaza (Chenopodium murale), Atacaca (Amaranthus dubius), Yuyo (Amaranthus hybridus), Yuyo (Amaranthus viridis), Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Remolón (Paspalum vagatum), Grama china (Sorghum halepense), Coquito (Cyperus rotundus), Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Grama dulce (Cynodon dactylon)	2 - 4	21	2.0
Mango	Amor seco (Bidens pilosa), Grama dulce (Cynodon dactylon), Lechera (Euphorbia heterophylla), Cola de asacón (Heliotropium angiospermum), Pata de gallina (Eleusine indica), Boerhaavia (Boerhaavia diffusa), Malva (Malvastrum coromandelianum), Pajilla (Chloris gayana)	3 - 4	14	0.2
Manzano	Hierba gallinaza (Chenopodium murale), Hierba gallinaza (Chenopodium ambrosioides), Yuyo (Amaranthus hybridus), Yuyo (Amaranthus spinosus), Coquito (Cyperus rotundus), Grama china (Sorghum halepense), Totora (Typha angustifolia), Grama dulce (Cynodon dactylon), Kikuyo (Pennisetum clandestinum)	2 - 4	14	0.1
Naranja	Grana china (Sorghum halepense), Coquito (Cyperus rotundus), Yuyo (Amaranthus dubius), Verdolaga (Portulaca oleraceae), Grama dulce (Cynodon dactylon), Hierba gallinaza (Chenopodium murale), Capulí cimarrón (Nicandra physalodes), Hierba mora (Solanum nigrum)	2 - 4	14	0.5
Palto	Codillo (Cenchrus echinatus), Coquito (Cyperus rotundus), Chamico (Datura stramonium), Grama dulce (Cynodon dactylon), Malva (Malvastrum coromandelianum), Pata de gallina (Eleusine indica)	2 - 3	14	0.2

P.C.: Período de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Dos (02)
Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento, sin sufrir estrés, poco antes de la floración.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CARA

CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa