

“LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es dañino, no ingerir.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Oxadiazine

En caso de intoxicación, llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir el vomito.

No administre nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladar a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar al CICOTOX 0-800 - 1- 3040 (atención 24 horas)
ESSALUD en línea 423-7600,

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del presente envase inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en la mañana o en las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

HOPROLE XTRA

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Indoxacarb 300 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg No:

Tiitular del Registro:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo No 401 Oficina 610 Santiago de Surco,

Tel: (01)7139960

Lima-Perú

Importado y Distribuido por:

Formulado Por:

SHANDONG WEIFANG

RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

Binhai Economic

Development Area, Weifang, Shandong 262737, China

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 2 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

HOPROLE XTRA es un insecticida de contacto e ingestión. Bloquea el transporte de sodio a través de la membrana de ciertas células nerviosas, lo que provoca la parálisis y muerte del insecto afectado.

PREPARACION DE LA MEZCLA:

Coloque la cantidad de **HOPROLE XTRA** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente.

Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Kg/ha	(días)	(mg/Kg)
PIMIENTO	Gusano comedor De hojas	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.115 - 0.125	14	0.3

P.C: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo dos aplicaciones por campaña de **HOPROLE XTRA** con un intervalo de aplicación de 14 días, en etapa de floración del cultivo y cuándo se observen los primeros síntomas de la plaga después de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: 12 Horas

COMPATIBILIDAD

HOPROLE XTRA es compatible con insecticidas y fungicidas de otros grupos químicos.

FITOTOXICIDAD:

HOPROLE XTRA No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

