

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximide (Iprodione) + Triazole (Myclobutanil)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida sistémico, de contacto y con actividad translaminar, es utilizado en el control de diversos hongos fitopatógenos en un amplio rango de cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRIMIX DUO 500 WP** de manera preventiva de acuerdo a las evaluaciones de campo y cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalos entre aplicación de 7 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado durante las primeras 24 horas después del tratamiento.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	0.3	14	1.0
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	14	1.0

P.C.: Período de Carenia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Iprodione	400 g/kg
Myclobutanil	100 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina - Lima
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 250 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CO., LTD
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**