

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Dicarboximide (Iprodione) + Triazole (Myclobutanil)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX : 0800-13040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA          |                   | DOSIS<br>kg/200 L | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
|         | Nombre Común   | Nombre Científico |                   |                |              |
| Vid     | Oidio          | Uncinula necator  | 0.3               | 14             | 1.0          |
|         | Pudrición gris | Botrytis cinerea  | 0.3-0.4           | 14             | 1.0          |

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carenia

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **BOTRIMIX DUO 500 WP** es un fungicida sistémico, de contacto y con actividad translaminar, es utilizado en el control de diversos hongos fitopatógenos en un amplio rango de cultivos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar la aplicación de **BOTRIMIX DUO 500 WP** de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 10 a 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo tratado durante las primeras 24 horas después del tratamiento.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**BOTRIMIX**  
**DUO 500 WP**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Iprodione ..... 400 g/kg  
Myclobutanil ..... 100 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2253 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

**CROP**  
BUSINESS S.A.C.  
*Asesores de Insumos*

Importado y Distribuido por:

**BIOAGROCORP TRADING S.A.C.**

Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 370-7251

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 250 g.**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI CHEMICAL E-TONG CO., LTD

N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District, Shanghai

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

