

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico:
Dicarboximide (Iprodione) + Triazole (Myclobutanil)
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- No tiene antidoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg /200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	Oidio	<i>Uncinula necator</i>	0.3	14	1.0
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	14	1.0

P.C.: Periodo de Carencia (días)

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida sistémico, de contacto y con actividad translaminar, es utilizado en el control de diversos hongos fitopatógenos en un amplio rango de cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRIMIX DUO 500 WP** de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 10 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratada durante las primeras 12 horas después del tratamiento.

FITOTOXICIDAD

BOTRYKILL 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Iprodione	400 g/Kg
Myclobutanil	100 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N°

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 500 grs

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO. LTD.

N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

