

30 cm

20 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico por ingestión, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximide (Iprodione) + Triazole (Myclobutanil)
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lavarlos inmediatamente con agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lavar la piel afectada con abundante agua y jabón por 15 minutos.
- En caso de ingestión no provocar al vómito sin supervisión médica, ni dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 08001-3040 CROP BUSINESS: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	0.3	14	10* 1.0**
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3-0.4	14	10* 1.0**
Cebolla	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	19	0.2* 0.06**

P.C.: Periodo de carencia (Días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

Iprodione*, Myclobutanil**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida sistémico, de contacto y con actividad translaminar, es utilizado en el control de diversos hongos fitopatógenos en un amplio rango de cultivos.

BOTRIMIX DUO 500 WP es un fungicida que contiene en su formulación dos ingredientes activos: Iprodione fungicida que impide la colonización, avance y esporulación de los hongos y Myclobutanil, actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosteroles de los hongos o sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios entre el medio ambiente y el interior del hongo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **BOTRIMIX DUO 500 WP** de manera preventiva cuando las condiciones ambientales sean propicio para el desarrollo del hongo o al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña, con intervalo entre aplicaciones de 10 a 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo tratado durante las primeras 24 horas después del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

BOTRIMIX DUO 500 WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

BOTRIMIX DUO 500 WP no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

20 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Iprodione 400 g/kg
Myclobutanil 100 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 2253 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote :

Contenido Neto : 1 Kg.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD
N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District - Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

30 cm