

Tamaño:29.2 x 15.3 cms
22.01.2021

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Mimético de la hormona juvenil.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico ni suministrar nada por vía oral si la persona se encuentra inconsciente.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Brindar respiración artificial de ser necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos como mínimo, levantando los párpados. Retirar lentes de contacto si los hubiera.

Nota al Médico: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: CETOX: 0800 71911
ESSALUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Chungar®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Pyriproxyfen.....100 g/L
Aditivos.....csp 1 L

PQUA N° 2240-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulado por:

TAGROS Chemicals India Pvt. Ltd.
Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building
IV Floor, 72 Marshalls Road, Egmore,
Chennai 600 008, India

Importado y Distribuido por:



Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Lote N° :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

Contenido Neto: 20 L



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Chungar es un insecticida del grupo de los miméticos de la hormona juvenil que controla "trips" en espárrago y vid y "queresa" en palto.

Agregar la cantidad necesaria de **Chungar** a la solución de aplicación y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L / 200 L	L/ha		
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0,15 - 0,20	0,23 - 0,5(1)	5	0,05
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0,10	0,20	7	2
Mandarina	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0,10	----	30	0,5
Palto	Queresa	<i>Fiorinia florinae</i>	0,15-0,20	0,4-0,5	14	1
Vid	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0,15 – 0,20	0,4-0,5	14	2,5

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuo

(1) Considerado para un gasto de agua de 300 - 500 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **Chungar** (i.e. Pyriproxyfen) no más de 2 aplicaciones por campaña/año en cultivo de cebolla, espárrago, palto y vid.

En el cultivo de mandarina, realizar máximo una sola aplicación por campaña/año.

Chungar debe aplicarse cuando se observe las primeras infestaciones y en los primeros estadios de desarrollo de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresa al área tratada antes de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

