17.00 cm

25.00 cm

Musya®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN:

Triflumizole.....300 g/Kg
Aditivos.....c.s.p 1Kg

PQUA N° 2230 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:

SummitAgro

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA., SUCURSAL PERU
Av. José Pardo 513 Of. 701 Miraflores. Lima - Perú. Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:
NIPPON SODA CO. LTD
2-1-2 Chome. Ohtemachi Chiyoda-ku Tokyo 100-8165. Japón.

CONTENIDO NETO : 1 Kg
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Número de Lote :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

2.50 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

17.00 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Imidazol
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-13040 (Linea gratuita) O
ESSALUD: 0801-10200 (Linea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, inutilice el envase y depósitelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlas la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MUSYA es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis del ergosterol, con acción preventiva y curativa especialmente formulado para el control de la oidiosis en el cultivo de vid.

MUSYA tiene una buena acción translaminar (sistémica local) y acción fumigante. Su eficacia no se reduce por la lluvia. Es eficaz en el control de razas resistentes a los fungicidas Benzimidazoles.

MUSYA se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
MUSYA debe ser aplicado en forma preventiva cuando aún no se observen los síntomas de la enfermedad y en forma curativa cuando se manifiestan los síntomas.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
MUSYA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
MUSYA no presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones en instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	g/200 L	Kg/ha		
Arroz	"Pyricularia"	*Pyricularia oryzae*	200	-	30	0.1
	"Sarocladium"	*Sarocladium oryzae*	200 - 250	-		
Mango	"Oidiosis"	*Oidium mangiferae*	125 - 150	-	1	2.5

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) **P.C.:** Periodo de Carencia